

Genabil®

Enjeksiyonluk Çözelti
Koleretik ve Dijestif

Bileşimi

Beher ml'sinde; 100 mg menbuton içerir.

Yasal Arınma Süresi

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) et ve süt için "0" gündür.

Endikasyonları

Sığır ve koyun: Besinsel dengesizlikler, rumende aşırı içerik birikmesi durumlarında (empaksiyon), konstipasyon, iştahsızlık, mide-barsak yangısı, yağlı karaciğer dejenerasyonu, ketozis ve timpani, her türlü gıda indijasyonları, barsak tembelliği, zehirlenmeler, hepatotoksik bozukluklar, sarılık, hepatodijestif metabolizma hastalıklarında kullanılır.

At: Konstipasyonla ilişkili kolik, besinsel dengesizlikler ve karaciğer dejenerasyonlarında kullanılır.

Köpek: Konstipasyon, iştahsızlık ve karaciğer dejenerasyonlarında kullanılır.

Uygulama Şekli ve Dozu

Derin i.m. ya da yavaş i.v. (vena jugularis) yolla uygulanmalıdır. 10 mg/kg canlı ağırlık dozuna karşılık gelen 0,1ml/kg canlı ağırlık dozunda uygulanır. İlk uygulamadan 48 saat sonra ikinci bir doz verilebilir. Atlarda, yalnızca yavaş i.v. enjeksiyonla uygulanmalıdır.

Takdim Şekli

Karton kutu içerisinde 100 ml'lik cam şişelerde sunulmaktadır.

KULLANMADAN ÖNCE PROSPEKTÜSÜ OKUYUNUZ.