




Tip 2 Diyabet (T2D) ve Böbrekler

T2D hastalarının yaklaşık %65'inin böbrek fonksiyonlarında bir miktar azalma vardır ya da bu açıdan risk taşırlar.¹⁻³



Böbrek fonksiyonlarında azalma, Tip 2 Diyabet hastalarında görülen ve morbidite ile mortalite oranlarındaki artıştan sorumlu olan birçok rahatsızlıktan biridir.⁴



Böbrek fonksiyonlarında azalma olması.




T2D hastalarında hipoglisemi riskini artırır.^{5,6}

Tip 2 Diyabeti olan kişiler, kardiyovasküler hastalık ve KV olaylara bağlı mortalitede artış bakımından daha yüksek risk altındadır.⁴



Bu risk, böbrek fonksiyonlarında azalma olan T2D hastalarında yaklaşık

3 KAT DAHA FAZLADIR.⁷



Şu anda mevcut olan anti-diyabetik tedavilerin bazıları, büyük oranda böbrekler yoluyla atılan ilaçlardır. Bu ilaçların, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalarda kullanılması tavsiye edilmez.^{8,9}

Böbrek fonksiyonları azaldıkça.^{8,9}

- 1-Tedavi seçenekleri giderek daha da azalır.
- 2-Doz seçimi giderek daha karmaşık bir hal alır.
- 3-Ek takip yapılması gerekebilir.

